

Apfel

Mehlige Apfelblattlaus:

Bei starkem Winterei Besatz ist eine Austriebsspritzung anzuraten

Calypso zugelassen bis 2015, 1ml / 5 l Wasser.

BBCH Stadium 10  Grüne Triebspitze deutlich sichtbar bis 61




 Blühbeginn.

Apfelblattlaus:

Siehe oben.

BBCH Stadium 10  Grüne Triebspitze deutlich sichtbar bis 72.

 Haselnussgröße.

Apfelwickler:

Insegar zugelassen bis 31.12.2013, 4g / 1 l Wasser

Bei Beginn der Eiablage
Maximal 3 Anwendungen

Dauerhaft Wirkung gegen Apfelwickler und gegen Fruchtschalenwickler Arten.

BBCH  71 (Fruchtdurchmesser 10 mm) bis BBCH 81



Schorf:

Vorbeugenden Einsatz bevorzugen (im Wechsel)

Netzschwefel: unter 10° kaum wirksam
mit Befallsmindernden Wirkung gegen Spinnmilben
vor der Blüte 0,7%
abfallend zur Blüte auf 0,5%
nach der Blüte 0,4%
abfallend auf 0,2%

Dithane NeoTec zugelassen bis 2014, 20g / 10 l Wasser

vor und nach der Blüte spritzen
im Abstand von 7 - 14 Tagen.



Austernschildläuse inkl. San-José-Schildlaus:

Bei deutlichem Vorjahresbefall ist eine frühe und sehr gründliche Behandlung mit Mineralöl oder Rapsöl möglichst Windstille und hohe Luftfeuchte

BBCH Stadium 51-52  empfehlenswert

